



ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  
**МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР**  
ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ **ЛУКИ**

## ПАМЯТКА. ПОДГОТОВКА К ТАБ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ТОНКОИГОЛЬНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ БИОПСИЯ) ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ

**ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТАБ** - уточнить является ли узел опухолью (доброкачественной или злокачественной).

### ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ВКЛЮЧАЕТ:

1. Перед манипуляцией принять гигиенический душ, при необходимости побрить область операции в соответствии с рекомендациями хирурга.
2. В день манипуляции Вам необходимо явиться в Медицинский центр за 10-15 минут для оформления медицинских документов.
3. При себе необходимо иметь следующие результаты анализов:
  - УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ- **давностью не более 3 месяцев.**
  - АНАЛИЗЫ КРОВИ:- **давностью не более 3 месяцев.**
    - Клинический анализ крови (общий анализ, лейкоформула, СОЭ)
    - Тиреотропный гормон (ТТГ),
    - Трийодтиронин свободный (Т3 свободный),
    - Тироксин свободный (Т4 свободный),
    - Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО)
  - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА (С РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛИЗОВ, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ)

### ВНИМАНИЕ:

Если вы постоянно принимаете препараты, изменяющие свертывающие свойства крови на основе Ацетилсалициловой кислоты (Аспирин, Кардиомагнил, Тромбо-асс), Клопидогрел (Плавикс, Зилт, Плагрил), **за 3 дня до исследования необходимо отменить препарат. И возобновить прием препарата в течение 24 часов после ТАБ.**

Манипуляция малотравматична, малоболезненна, проводится в амбулаторных условиях, не требует анестезии.

В день процедуры пациентам можно принимать пищу.

Не рекомендуется выполнение ТАБ натошак, при высоком артериальном давлении, при наличии герпетических высыпаний на лице, признаков простуды ОРВИ, гриппе.